

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie drzew i krzewów w następującym asortymencie i wg poniżej określonej specyfikacji ilościowo – rzeczowej.

Lp.	Nazwa	Ilość	Opis
1.	buk czerwony (<i>Fagus sylvatica Atropunicea</i>)	2 szt.	Forma pienna Pa 150 – 200 cm, obwód pnia 14 - 16 cm, soliter, bryła.
2.	grab (<i>Carpinus betulus 'Fastigiata'</i>)	9 szt.	Forma pienna Pa 100 – 160 cm, obwód pnia 12 – 14 cm, soliter bryła.
3.	miłorząb (<i>Ginko biloba</i>)	3 szt.	Forma naturalna, obwód pnia 12 - 14 cm, soliter, bryła.
4.	Gleditsia triacanthos 'SUNBURST'	2 szt.	Forma naturalna, obwód pnia 12 - 14 cm, soliter, bryła.
5.	klon - (<i>Acer rubrum RED SUNSET</i>)	3 szt.	Forma pienna Pa 150 – 200 cm, obwód pnia 12 – 14 cm, soliter bryła.
6.	lipa - (<i>Tilia cordata GREENSPIRE</i>)	7 szt.	Forma pienna Pa 150 – 200 cm, obwód pnia 10 – 12 cm, soliter bryła.
7.	jałowiec (<i>Juniperus x media PFITZERIANA AUREA</i>)	40 szt.	Wysokość 25 – 30 cm, C3.

Dostarczone sadzonki powinny spełniać następujące warunki jakościowe:

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- u roślin z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,
- pędy boczne korony drzewa powinny być liczne i równomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien być praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
- formy kuliste powinny mieć dobrze uformowaną, symetryczną koronę z licznymi rozgałęzieniami,
- przy formach piennych pień winien być prosty, pozbawiony pozostałości po usuniętych konarach, wysokość pnia mierzona od bryły korzeniowej do najniższych konarów korony,
- poszczególne egzemplarze drzew winny być opatrzone opisem z oznaczeniem gatunku i parametrów charakteryzujących dany egzemplarz – nie dotyczy krzewów zamawianych w ilości powyżej 30 szt. w takim przypadku należy oznaczyć jedynie kilka egzemplarzy.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.